

NO PUEDEN
acudir a clase durante el periodo de exclusión escolar




ENFERMEDAD	VÍA DE TRANSMISIÓN	PERIODO EXCLUSIÓN ESCOLAR APROXIMADO	ENFERMEDAD	VÍA DE TRANSMISIÓN	PERIODO EXCLUSIÓN ESCOLAR APROXIMADO
ESCARLATINA	Secreciones respiratorias	1 día después de inicio del tratamiento	RUBEOLA	Respiratoria	5 días
FARINGITIS	Secreciones respiratorias	1 días después del inicio del tratamiento	SARAMPION	Respiratoria	5 días
GASTROENTERITIS	Fecal- Oral	Hasta 24-48h sin síntomas	SARNA	Contacto directo	Hasta completar tratamiento
HEPATITIS A	Fecal-Oral-Agua, Alimentos	De 5-7 días tras inicio de la ictericia/ó otros síntomas	TOSFERINA	Respiratoria	Hasta 5 días tras el inicio del tto antibiótico
MENINGITIS	Respiratoria	Mientras dure la enfermedad	TUBERCULOSIS	Respiratoria	2 semanas
IMPETIGO	Contacto directo	Hasta la curación de las lesiones ó tras 48 horas del inicio del tto antibiótico	VARICELA/HERPES ZOSTER	Contacto directo, Respiratorio, Vertical	Hasta lesiones en fase de costra (ó 5 días)
PAPERAS	Respiratoria	5 días	COVID 19	Respiratorio, Contacto directo.	3 días

PUEDEN acudir a clase

Pueden acudir al colegio :
 -SI han iniciado el tratamiento para aquellas enfermedades que así lo precisen.
 - SI el estado general es bueno y el niño está sin fiebre.
 -MANTENIENDO las correctas medidas de higiene.

CONJUNTIVITIS	
ERITEMA INFECCIOSO	
EXANTEMA SÚBITO	
GRIPE	
HEPATITIS B Y C	
INFECCIÓN RESPIRATORIA	
LOMBRICES	
MOLLUSCUM	

PIOJOS	
SIDA O INFECCIÓN POR VIH	
SÍNDROME MONONUCLEOSICO	
SÍNDROME PIE-MANO-BOCA	
TIÑA	
VERRUGAS	

Es importante saber

- El portador puede ser asintomático.
- En algunas de estas enfermedades la transmisión empieza antes del inicio de los síntomas.
- Se puede acudir al colegio una vez iniciado el tratamiento, si el estado general es bueno y el niño está sin fiebre.
- Es importante mantener las correctas medidas de higiene



Prevención

- Mantener una buena higiene en las instalaciones y una adecuada ventilación
- Lavar a menudo los juguetes y objetos de uso común
- Lavado de manos en educadores y niños
- Usar pañuelos desechables para limpiar mocos, saliva...
- Cubrir la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser
- No acudir a piscinas.

Higiene

- Adaptar el número de niños a las dimensiones del aula
- Evitar asistir al colegio si enfermedad, según las recomendaciones de su pediatra
- Mantener al día las VACUNAS
- Comunicación de los brotes infecciosos que surgen en el colegio.